

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## COLZA : stade F1 - G1

### Méligèthes

Le vol reste moyen (610 captures) et l'activité au champ est réduite même par beau temps. On atteint en toute zone, le stade fin de sensibilité (F1).

*Ne plus intervenir.*

### Charançons des siliques

Le vol est important ; plus de 500 captures ont été enregistrées à ce jour. L'activité au champ devient significative, mais le colza **n'est pas encore au stade sensible (G2).**

*A partir de G2, intervenez par une journée favorable à l'activité des insectes dès que vous atteignez le seuil de 10 charançons pour 50 plantes.*

### Pucerons cendrés

Les premières colonies sont observées dans un bon nombre de parcelles. Le seuil de 2 colonies au m<sup>2</sup> n'est pas encore atteint.

*Intervenez avec un aphicide spécifique, dès que vous atteignez le seuil de 2 colonies au m<sup>2</sup>.*

*Un traitement de bordure peut s'avérer judicieux dans un premier temps.*

## MALADIES

La stratégie maladies du précédent bulletin reste valable.

*Le traitement prévu en G1 peut éventuellement être légèrement décalé, si le beau temps persiste.*

## POIS : levée à 4 feuilles

### Sitones

Les **morsures** sont présentes sur l'ensemble des parcelles, mais rares sont celles atteignant la note 2. Le beau temps va permettre au ravageur de poursuivre et d'accentuer son activité.

## REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°08 du 1<sup>er</sup> Avril 1999 - 1 page

*Dès que vous atteignez la note 2, un traitement est justifié (voir Avertel page 20).*

## CEREALES

**BLE** : stade épi 3 cm à 1-2 Noeuds

### Piétin Verse

**Pas d'évolution** du risque climatique et de la fréquence d'attaque (en parcelles à levée précoce).

*Les indications du précédent bulletin restent valables.*

### Oïdium

il est observé de façon irrégulière sur variétés sensibles.

### Rouille Brune

Stagnation du risque y compris dans les situations à priori les plus « exposées » (variétés sensibles à levée précoce en façade atlantique...). La maladie est **pratiquement absente** en parcelles.

### Septoriose

Elle reste cantonnée aux feuilles basses.

*Les interventions visant les maladies foliaires ne sont pas justifiées actuellement (le faible passage pluvieux prévu du 1<sup>er</sup> au 3 ne conduira pas à modifier cette analyse).*

## ORGE D'HIVER

Stade épi 3 cm à 1 noeud

### Maladies foliaires

La situation est très hétérogène avec des parcelles à forte pression de **rhynchosporiose** sur F4-F3 et des situations avec une dominante helminthosporiose sur F4-F3 (accompagnée de rouille naine et d'oïdium avec un niveau de pression plus faible).

*Intervenir rapidement (sauf rares parcelles en net retard végétatif et encore peu atteintes par les maladies).*

## COLZA

Pucerons : à surveiller.

## BLE

Maladies foliaires : intervention non justifiée

## ORGE D'HIVER

Maladies : intervenir



Grandes Cultures

Service Régional de la  
Protection des  
Végétaux  
13 route de la Forêt  
86580 BIAUD  
☎ : 05 49 62 98 25  
Fax : 05 49 62 98 26

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles de POITOU-  
CHARENTES

Le Directeur-Gérant :  
L. JUILLARD  
CONDAT

Publication périodique  
C.P.A.P. n° 2139 AD  
ISSN n° 02294 470

5340 2 40830

P36